

# DOLALIVIO FAST

Diclofenaco Sódico 2%

**Gel**

Analgésico - Antiinflamatorio

**Lea detenidamente todo el inserto porque contiene información importante para usted. Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.**

- Conserve este inserto ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, debe consultar al médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este inserto, informe a su médico o farmacéutico.

## 1. ¿QUÉ ES DOLALIVIO FAST 2% GEL Y CUÁNDO SE USA?

Dolalivio Fast 2% Gel contiene el principio activo diclofenaco, que pertenece a un grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos (analgésicos y antiinflamatorios). Diclofenaco tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias y tiene un efecto calmante y refrescante gracias a su base hidroalcohólica.

Este medicamento se utiliza para el tratamiento local del dolor, la inflamación y la hinchazón en deportes y lesiones accidentales, esguinces, hematomas, distensiones y dolor de espalda accidental. También se puede utilizar para el tratamiento local a corto plazo de las condiciones de dolor agudo en la osteoartritis de pequeñas y medianas articulaciones, por ejemplo: se utilizan en las articulaciones de los dedos o las rodillas.

Se recomienda el uso de Dolalivio Fast 2% Gel en adultos y niños mayores de 12 años.

## 2. ¿CUÁNDO NO DEBE USARSE DOLALIVIO FAST 1% Gel?

Este medicamento no debe utilizarse en caso de hipersensibilidad al diclofenaco u otras sustancias analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas (en particular ácido acetilsalicílico/aspirina e ibuprofeno) o hipersensibilidad al propilenglicol, alcohol isopropílico u otros excipientes. Dicha hipersensibilidad se manifiesta, por ejemplo en asma, dificultad para respirar, erupción cutánea, urticaria, hinchazón de la cara y/o lengua y secreción nasal.

No debe utilizarse durante los últimos 3 meses de embarazo (ver "¿Se puede usar Dolalivio Fast 2% Gel durante el embarazo o la lactancia?").

## 3. ¿CUÁNDO SE DEBE TENER CUIDADO AL USAR DOLALIVIO FAST 2% GEL?

- No se debe aplicar sobre heridas abiertas en la piel (como abrasiones, cortes) o piel dañada (por ejemplo, eccema, erupciones cutáneas).
- Detenga inmediatamente el tratamiento si ocurre una erupción después de la aplicación.
- No se debe utilizar durante mucho tiempo en un área grande, a menos que sea bajo prescripción médica.
- No deben entrar en contacto con el producto los ojos y las membranas mucosas. Si esto sucede, enjuáguese bien con agua e informe al médico si los síntomas persisten. No ingiera el medicamento. Lávese las manos después de usar.
- Debido al contenido de propilenglicol, puede causar irritación local de la piel en algunos pacientes.
- No debe usarse con vendajes herméticos.
- Informe a su médico o farmacéutico, si ha tenido previamente síntomas alérgicos después de usar otros medicamentos similares, si padece otras enfermedades, tiene alergias o toma o usa otros medicamentos (incluso los que compró) de forma externa.

## 4. ¿SE PUEDE USAR DOLALIVIO FAST 2% GEL DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA?

Este producto no debe utilizarse durante el primer y segundo trimestre del embarazo o durante la lactancia, a menos que así lo indique expresamente un médico. **No debe usarse** durante los últimos 3 meses de embarazo ya que puede dañar al feto o causar problemas de nacimiento. Si planea quedar embarazada, debe consultar al médico o farmacéutico antes de usar.

## 5. ¿CÓMO SE USA DOLALIVIO FAST 2% GEL?

**Vía de administración:** Tópica

### Adultos y adolescentes a partir de 12 años

Dependiendo del tamaño de las áreas dolorosas o hinchadas a tratar, se aplica una cantidad de 2-4 g del producto (cantidad al tamaño de una cereza o nuez) dos veces al día (por la mañana y por la noche), frotando ligeramente o masajeando en caso de dolor muscular. Lávese bien las manos después del uso, a excepción de que el tratamiento sea por la artrosis del dedo.

Si olvida aplicar el tratamiento a la hora correcta, aplique el producto cuando lo recuerde. No utilice el doble de la cantidad para compensar la aplicación olvidada.

Informe a su médico si los síntomas empeoran o si los síntomas no han mejorado después de una semana. Dolalivio Fast 2% Gel no debe usarse por más de 2 semanas.

### Niños menores de 12 años

El uso y la seguridad de diclofenaco en niños menores de 12 años no han sido probados sistemáticamente. La aplicación, por lo tanto, no es recomendable. Si usted o su hijo ingirieron inadvertidamente este producto, contacte a su médico inmediatamente.

Siga la dosis indicada en el inserto o la prescrita por el médico. Si cree que el medicamento es demasiado débil o demasiado fuerte, hable con su médico o farmacéutico.

## 6. ¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS PUEDE TENER DOLALIVIO FAST 2% GEL?

Los siguientes efectos secundarios pueden ocurrir al usar este medicamento: Algunos efectos secundarios raros o muy raros pueden ser graves.

Si presenta cualquiera de los siguientes efectos secundarios, suspenda el tratamiento con Dolalivio Fast 2% Gel e informe a su médico de inmediato:

- Erupción severa con ampollas, urticaria.
- Sibilancias, dificultad para respirar, asma.
- Hinchazón en el área de la cara, los labios, la lengua y el cuello.

Los siguientes otros efectos secundarios generalmente son leves y transitorios:

- Frecuentes: sarpullido, picazón, enrojecimiento, quemazón de la piel.
- En casos muy raros, puede aumentar la sensibilidad a la luz solar. Los signos incluyen quemaduras solares con picazón, hinchazón y formación de ampollas.

### Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este inserto. También puede comunicarlos directamente a través del área de Farmacovigilancia de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).

## 7. QUÉ HACER EN CASO DE SOBREDOSIS

La sobredosis es muy poco probable debido a la baja absorción sistémica de diclofenaco aplicado de forma tópica. Se esperan efectos adversos similares a los de la sobredosis con tabletas de diclofenaco en caso de ingestión accidental del producto. Si se producen efectos secundarios sistémicos significativos como resultado de un uso inadecuado o una sobredosis oral accidental (como en niños), se deben usar las medidas terapéuticas habituales usadas para tratar la sobredosis con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Debe considerarse el lavado gástrico y el tratamiento con carbón activado luego de un corto tiempo después de la ingestión.

## 8. CONSERVACIÓN DE DOLALIVIO FAST 2% GEL

Almacenar a temperatura no mayor de 30 °C.

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

## 9. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

### **Composición de DOLALIVIO FAST 2% Gel**

Cada 100 g. contiene: Diclofenaco dietilamina 2.320 g equivalente a diclofenaco sódico 2 g.

Los excipientes son: Diazolidinil urea, Imidurea, Propilenglicol, Acrilatos/C 10-30 alquil acrilato crosopolimero, Propilenglicol (y) Diazolidinil urea (y) Iodopropinil butilcarbamato, Trolamina, Alcohol isopropílico, Alcohol, Miristato de isopropilo, Aceite de ricino hidrogenado polioxilado 40 y Agua purificada.

**Aspecto del producto y contenido del envase**

Gel evanescente de aspecto uniforme libre de partículas extrañas, de color blanquecino, prácticamente inodoro.

**Responsable de la fabricación**

Laboratorios Portugal S.R.L.

**Titular de la autorización de comercialización**

**INTIPHARMA S.A.C.**

Lima - Perú