

DOLALIVIO FLEX

Paracetamol 450 mg + Orfenadrina citrato 35 mg

Tableta

Relajante muscular

Lea todo el inserto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento. Contiene información que es importante para usted.

- Guarde este inserto, es posible que necesite leerlo nuevamente.
- Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento le ha sido recetado únicamente a usted. No se lo de a otras personas. Puede hacerles daño, incluso si muestran síntomas similares a los suyos.
- Si experimenta alguna reacción adversa consulte a su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a cualquier reacción adversa no mencionada en este inserto. Consulte la sección 4.

Este inserto contiene la siguiente información:

1. ¿Qué es DOLALIVIO FLEX y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de tomar DOLALIVIO FLEX?
3. ¿Cómo tomar DOLALIVIO FLEX?
4. Posibles reacciones adversas
5. Conservación de DOLALIVIO FLEX
6. Contenido del envase y otra información

1. ¿Qué es DOLALIVIO FLEX y para qué se utiliza?

DOLALIVIO FLEX es una preparación combinada que tiene un efecto relajante muscular, analgésico y antipirético.

DOLALIVIO FLEX se usa para aliviar el dolor muscular relacionado con esguinces, torceduras, lesiones musculares, ciertas enfermedades infecciosas, inflamación del tejido conectivo, lesiones de la médula espinal, dolor de garganta, lesiones esqueléticas y dolores de cabeza por estrés. DOLALIVIO FLEX también se usa para problemas menstruales.

2. ¿Qué necesita saber antes de tomar DOLALIVIO FLEX?

No use DOLALIVIO FLEX:

- Si es alérgico al citrato de orfenadrina o al paracetamol o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar DOLALIVIO FLEX:

- Si tiene palpitaciones.
- Si tiene agrandamiento de la próstata.
- Si tiene cataratas (glaucoma).

Si tiene una cámara anterior del ojo poco profunda y un ángulo ventricular estrecho, el tratamiento puede desencadenar un ataque de glaucoma agudo causado por la dilatación de la pupila, pero esta condición es muy poco común.

Riesgo de daño hepático producido por el consumo inadvertido de paracetamol superior a la dosis máxima diaria recomendada (4 gramos).

Nunca tome más DOLALIVIO FLEX de lo recomendado por su médico. Si está tomando otros analgésicos que contengan paracetamol, no use DOLALIVIO FLEX sin antes consultar con su médico o farmacéutico.

Las dosis más altas que las recomendadas no brindan un mejor alivio del dolor, pero conllevan a un riesgo de daño hepático muy grave. Los síntomas de daño hepático generalmente aparecen solo después de unos días. Por lo tanto, es importante que se ponga en contacto con un médico lo antes posible si ha tomado una dosis demasiado alta.

El riesgo de este tipo de daño hepático aumenta con el abuso de alcohol. Informe siempre a su médico si tiene problemas con el alcohol o daño hepático. El efecto intoxicante del alcohol no aumenta con la adición de DOLALIVIO FLEX.

No use DOLALIVIO FLEX sin receta médica si tiene problemas con el alcohol o daño hepático, ni use DOLALIVIO FLEX con alcohol.

Otros medicamentos y DOLALIVIO FLEX

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Esto también se aplica a los medicamentos de venta libre y a las hierbas medicinales.

DOLALIVIO FLEX puede afectar o verse afectado si se toma al mismo tiempo que otros medicamentos:

- Warfarina (anticoagulante). No se considera que las dosis únicas de DOLALIVIO FLEX afecten el efecto de la warfarina.
- Cloranfenicol (medicamento para infecciones bacterianas).
- Probenecid (medicamento para la gota).
- Fenitoína, fenobarbital y carbamazepina (medicamentos antiepilépticos).
- Antihistamínicos (medicamentos para las alergias).
- Antiespasmódicos (medicamentos para ciertos problemas intestinales).
- Antidepresivos tricíclicos (antidepresivos).
- Inhibidores de la MAO (medicamentos antidepresivos y para la enfermedad de Parkinson).
- Fenotiazinas (medicamentos para enfermedades mentales).
- Medicamentos antiparkinsonianos dopaminérgicos, incluida la amantadina (medicamentos utilizados para tratar la enfermedad de Parkinson).
- Medicamentos antiarrítmicos como la disopiramida (medicamentos para los latidos cardíacos irregulares).
- El alcohol puede reducir el efecto de DOLALIVIO FLEX.
- DOLALIVIO FLEX puede reducir la motilidad del tracto gastrointestinal y, por lo tanto, afectar la absorción de otros medicamentos orales.
- Opioides (medicamentos similares a la morfina), ya que pueden causar somnolencia y dificultad para respirar.

Embarazo y lactancia

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Capacidad para conducir y utilizar máquinas

Durante el tratamiento con DOLALIVIO FLEX, la capacidad de reacción puede verse reducida. Esto debe tenerse en cuenta cuando se requiere una mayor atención, por ejemplo, al conducir un automóvil.

Usted es responsable de evaluar si está en condiciones de conducir un vehículo motorizado o realizar un trabajo que requiera mayor atención. Uno de los factores que pueden afectar su capacidad en estos aspectos es el uso de drogas debido a sus efectos y/o reacciones adversas. Las descripciones de estos efectos y reacciones adversas se pueden encontrar en otras secciones. Lea toda la información de este inserto como guía. Si no está seguro, consulte con su médico o farmacéutico.

3. ¿Cómo tomar DOLALIVIO FLEX?

Utilice siempre este medicamento exactamente como le ha indicado su médico o farmacéutico. Pregúntele a su médico o farmacéutico si no está seguro.

La dosis la determina su médico, quien la ajustará individualmente para usted. La dosis habitual para adultos es de 2 tabletas 3 veces al día.

Si tiene la impresión de que el efecto de DOLALIVIO FLEX es demasiado fuerte o demasiado débil, consulte a su médico o farmacéutico.

¡Nota! Dosis superiores a las recomendadas conllevan a un riesgo de daño hepático muy grave.

Si ha tomado demasiado DOLALIVIO FLEX

Si ha tomado demasiado medicamento o si, por ejemplo, un niño ha tomado el medicamento por error, póngase en contacto con un médico o un hospital para obtener asesoramiento y evaluación de riesgos.

Los síntomas de daño hepático generalmente aparecen solo después de unos días. Por lo tanto, es importante que se ponga en contacto con un médico lo antes posible si ha tomado una dosis demasiado alta.

Si olvidó tomar DOLALIVIO FLEX

No tome una dosis doble para compensar las tabletas olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, consulte con su médico o farmacéutico.

4. Posibles reacciones adversas

Al igual que todos los medicamentos, DOLALIVIO FLEX puede producir reacciones adversas, aunque no todas las personas las sufran.

Deje de tomar DOLALIVIO FLEX y contacte con un médico inmediatamente si presenta alguno de los siguientes síntomas (angioedema)

- Hinchazón de la cara, la lengua o la garganta.
- Dificultad para tragar.
- Urticaria y dificultad para respirar.

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): fatiga, mareos, náuseas, visión borrosa y sequedad de boca.

Raras (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas): urticaria, picor, angioedema, daño hepático, aumento de los niveles de creatinina (una sustancia que refleja la función de los riñones).

Muy raras (pueden afectar hasta 1 de cada 10000 personas): reacciones cutáneas graves, alucinaciones, confusión, temblores, dificultad para enfocar la visión, palpitaciones, estreñimiento y dificultad para orinar.

Riesgo de reacciones adversas serias en la piel como dermatitis alérgica, erupción, prurito, urticaria, edema, Stevens-Johnson, Necrólisis Epidérmica Tóxica y Pustulosis Exantémica Generalizada Aguda.

Se ha producido daño hepático cuando se usa paracetamol en relación con el abuso de alcohol. Con el uso a largo plazo, no se puede descartar por completo el riesgo de daño renal.

Notificación de reacciones adversas

Si experimenta alguna reacción adversa, consulte con su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a las reacciones adversas que no se mencionan en este inserto. También puede notificar las reacciones adversas directamente a través del Sistema Peruano de Farmacovigilancia farmacovigilancia@minsa.gob.pe o a través del siguiente correo farmacovigilanciaintipharma@gmail.com. Al notificar las reacciones adversas, puede ayudar a incrementar la información sobre la seguridad del medicamento.

5. Conservación de DOLALIVIO FLEX

Almacenar a una temperatura no mayor de 30 °C.

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños y adolescentes.

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase después de F.V. La fecha de vencimiento es el último día del mes especificado.

Los medicamentos no deben desecharse en aguas residuales o residuos domésticos. Pregúntele a su farmacéutico como deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información

Composición de DOLALIVIO FLEX

Cada tableta contiene:

Paracetamol.....450 mg

Orfenadrina citrato.....35 mg

Excipientes c.s.p.

Los demás componentes son: Povidona K-30, Almidón pregelatinizado, Celulosa microcristalina (grado 200), Gelatina, Glicerol, Almidón glicolato sódico tipo A, Dióxido de silicio coloidal, Estearato de magnesio, Agua purificada.

Aspecto del medicamento y contenido del envase

DOLALIVIO FLEX se presenta en caja de cartulina foldcote con 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 y 120 tabletas en Blíster Aluminio / PVC Incoloro.

Titular de la autorización de comercialización

INTIPHARMA S.A.C.
RUC: 20428837780
Calle Bolívar N° 270, Of. 701
Miraflores – Lima