

HIGARIL B COMPUESTO

Silimarina + Complejo B

Cápsula

COMPOSICIÓN

Cada cápsula contiene:

Silimarina 80%	187.5mg
(Eq. a 150.0 mg de silimarina) [como extracto de <i>Silybum marianum</i>]	
Tiamina clorhidrato	2 mg
Riboflavina base	2 mg
Nicotinamida	10 mg
Piridoxina clorhidrato	0.125 mg
Calcio pantotenato	2 mg
Excipientes c.s.p.	

USO RECOMENDADO

HIGARIL B COMPUESTO es usado tradicionalmente:

Como coadyuvante en el tratamiento de intoxicación por tetracloruro de carbono y en casos de hepatitis alcohólicas.

Antioxidante.

En caso de intoxicación por *Amanita phalloides*.

HIGARIL B COMPUESTO es un producto que contiene silimarina, compuesto natural extraído a partir de la planta *Silybum marianum*.

INTERACCIONES

No se han reportado interacciones medicamentosas con silimarina.

Alcohol: Su uso puede potenciar los efectos depresores del Sistema Nervioso Central e interferir con la absorción de riboflavina y tiamina.

Antidepresivos tricíclicos: Incrementan los requerimientos de riboflavina.

Cicloserina; etionamida; hidralazina; inmunosupresores como azatioprina, clorambucilo, corticosteroides, corticotropina (ACTH), ciclofosfamida, ciclosporina, mercaptopurina, isoniazida,

penicilamina: Actúan como antagonistas de la piridoxina o incrementan su excreción renal. Los estrógenos o anticonceptivos orales que los contengan pueden aumentar los requerimientos de piridoxina.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la silimarina o a cualquiera de sus componentes.

Obstrucción de las vías biliares u otras patologías de la vesícula biliar.

PRECAUCIONES

No hay información sobre precauciones generales para el uso de HIGARIL B COMPUESTO.

Embarazo

No hay información disponible sobre su uso en gestantes. No administrar durante el embarazo

Lactancia

No se dispone de datos acerca de su posible aparición en la leche materna.

Pediátricas

No hay información disponible sobre su uso en niños.

Geriátricas

No se ha reportado efectos adversos sobre su uso en la población geriátrica.

REACCIONES ADVERSAS

En raras ocasiones se han reportado epigastralgias, aceleración del tránsito intestinal o reacciones alérgicas.

Tener precaución en pacientes con obstrucción de las vías biliares.

ADVERTENCIAS

Si se presentan reacciones adversas se debe reducir la dosis, caso contrario suspender su uso, según indicación médica.

DOSIFICACIÓN

Adultos

Dosis de ataque: Una cápsula de HIGARIL B COMPUESTO, 3 veces al día, durante 4 a 6 semanas.

Dosis de mantenimiento: Una cápsula de HIGARIL B COMPUESTO, 2 veces al día hasta la desaparición de los síntomas.

En caso de alcoholismo: se recomienda 1 cápsula de HIGARIL B COMPUESTO, cada 6 horas por 4 a 8 semanas.

Vía de administración: Oral

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS

No se ha reportado sobredosis con silimarina.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto a temperatura no mayor a 30°C.

INTIPHARMA S.A.C.

Calle Bolívar 270 Of. 701, Miraflores
Lima — Perú.