

HEDRALIV

Hedera hélix 35mg/5mL

Solución Oral

Composición:

Cada 5mL de solución oral contiene:

Hedera hélix 35mg

(Como extracto equivalente a 4.2mg de hederacosido C)

Excipientes c.s.p.

*Agite bien el frasco antes de usar

Uso Tradicional recomendado:

Como coadyuvante en el tratamiento de procesos respiratorios que cursan con secreción bronquial.

Dosificación:

Adultos y adolescentes mayores de 12 años: Tomar 5mL 3 veces al día

Niños de 6 a 12 años: Tomar 5mL 2 veces al día

Niños de 2 a 5 años: Tomar 2.5mL 2 veces al día

Contraindicaciones:

Está contraindicado en niños menores de 2 años ya que existe el riesgo de que se agraven los síntomas respiratorios. Hipersensibilidad a alguno de los componentes de este producto o a las plantas de la familia de las Araliaceas. No administrar en casos de embarazo y lactancia.

Precauciones:

Cuando ocurre disnea, fiebre o esputo purulento, se debe consultar a un médico o farmacéutico. Consultar al médico si los síntomas persisten por más de 7 días o si estos empeoran. En casos de niños, administrar bajo supervisión médica y consulte al farmacéutico. Este producto contiene sorbitol, por ello podría causar molestias de estómago y diarrea.

Interacciones con medicamentos:

No se conoce interacciones con medicamentos, sin embargo, siempre informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente medicamentos. No se recomienda el uso concomitante con otros antitusivos opiáceos como la codeína o el dextrometorfano sin previa consulta médica.

Advertencias:

Se recomienda precaución en pacientes con gastritis o úlcera gástrica. La tos persistente o recurrente en niños entre 2 y 4 años requiere un diagnóstico médico antes del tratamiento

Reacciones adversas:

Puede tener efectos laxantes debido al contenido de sorbitol en el producto.

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar a entre 1 y 10 de cada 100 pacientes): se han notificado reacciones del sistema gastrointestinal como náuseas, vómitos o diarrea.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar a entre 1 y 10 de cada 1000 pacientes): se han notificado reacciones alérgicas como urticaria, erupciones cutáneas, dificultad para respirar (disnea). Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, si nota síntomas de alergia (hipersensibilidad), interrumpa la toma.

Mantener alejado de los niños.

Venta sin receta médica,

Vía de administración oral

Almacenar a temperatura no mayor de 30°C

INTIPHARMA S.A.C.

Lima – Perú