

UROPHARMA

Fenazopiridina clorhidrato 100mg
Tableta Recubierta
ANALGÉSICO DE LAS VÍAS URINARIAS

COMPOSICIÓN

Cada tableta recubierta contiene:
Fenazopiridina clorhidrato.....100mg
Excipientes c.s.p

INDICACIONES Y USO

El profesional médico receta UROPHARMA para usted o más personas con las siguientes condiciones médicas:

Dolor, ardor, urgencia, frecuencia, y otras molestias resultantes de las vías urinarias inferiores causadas por la infección, trauma, cirugía, procedimientos endoscópicos, o el paso de sonidos o catéteres.

UROPHARMA está indicado para el uso a corto plazo y puede solamente aliviar los síntomas; no es para un tratamiento para la causa subyacente de los síntomas.

- Qué hace:

UROPHARMA se excreta en la orina, donde ejerce un efecto analgésico tópico sobre la mucosa de la parte baja del tracto urinario. Esta acción ayuda a aliviar el dolor, ardor, urgencia y frecuencia. El mecanismo preciso de acción es desconocido.

- Cuándo no se debe utilizar:

Si su piel o la parte blanca de los ojos desarrollan un tono amarillento, puede indicar que los riñones no realizan la eliminación del medicamento como debería. DETENER LA ADMINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO Y LLAMAR A SU MÉDICO INMEDIATAMENTE.

Si usted tiene, o ha tenido, cualquiera de las siguientes condiciones médicas, consulte a su médico para las opciones de tratamiento que no sean UROPHARMA:

- Hipersensibilidad a la droga o a sus ingredientes
- Insuficiencia renal.
- Enfermedad hepática grave.

CONTRAINDICACIONES

NO TOMAR UROPHARMA si usted tiene cualquiera de las siguientes condiciones médicas:

- Hipersensibilidad al medicamento o sus ingredientes (principio activo o excipientes).
- Insuficiencia renal.
- Enfermedad hepática grave.

UROPHARMA NO debe ser usado en pacientes menores de 18 años de edad, ya que la seguridad y la eficacia NO se han establecido.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Fenazopiridina produce una coloración naranja a rojo en la orina y las heces, y pueden causar manchas. Tinción de lentes de contacto también se ha informado. Si usted es un adulto mayor, el médico le vigilará más de cerca, ya que los riñones funcionan con menos eficacia con la edad. Antes de tomar este medicamento, informe al profesional médico si tiene cualquiera de los siguientes problemas:

- Deficiencia de G-6-PD
- Insuficiencia renal
- Enfermedad hepática grave
- Intolerancia a la lactosa
- Cualquier otro problema médico

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS

De presentarse visión borrosa o cualquier disturbio visual se debe evitar conducir vehículos u operar maquinaria pesada.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS

Hable con el profesional médico y farmacéutico si usted está tomando cualquier otro medicamento (con prescripción o sin receta) tal como el siguiente:

- Ciprofloxacino

No hay otras interacciones que se hayan reportado

DOSIS Y VÍA ADMINISTRACIÓN

Vía de administración: Oral

Adultos

Dosis habitual: 200 mg 3 veces al día después de las comidas.

Tome UROPHARMA tal como le indicó el profesional médico. NO tome más del medicamento, no lo tome a menudo y no lo tome por un período largo de tiempo que no sea lo recomendado por el profesional médico. Si es posible, se debe tomar la dosis más baja de este medicamento durante el menor tiempo posible. Tomar demasiado UROPHARMA puede incrementar los efectos no deseados y efectos secundarios peligrosos, especialmente si usted es una persona mayor, y tiene otras enfermedades.

Si va a usar UROPHARMA durante más de 2 días, consulte a su médico regularmente para verificar si este medicamento está trabajando correctamente para usted o si es causante de efectos no deseados. Este medicamento ha sido recetado específicamente para usted. No se lo des a nadie más. Le puede hacer daño, aun cuando sus síntomas parecen ser similares a la tuya. UROPHARMA no se recomienda para su uso en pacientes menores de 18 años de edad, ya que la seguridad y la eficacia no se han establecido. Siga todas las instrucciones dadas a usted por su médico o farmacéutico cuidadosamente. Ellos pueden diferir de la información contenida en este prospecto. Si no entiende las instrucciones en el envase o botella, pregunte a su médico o farmacéutico.

Tome UROPHARMA exactamente como su médico le ha prescrito.

UROPHARMA debe tomarse después de las comidas.

La falta de dosis

Si se olvida una dosis, usted debe tomarla tan pronto como se recuerde. Si es casi la hora de la siguiente dosis, no tome la dosis olvidada y vuelva a su dosificación habitual programada. No duplique la dosis para ponerse al día.

SOBREDOSIS

Si usted toma más de la dosis prescrita, contáctese con el profesional médico inmediatamente.

REACCIONES ADVERSAS

EFECTOS SECUNDARIOS GRAVES, CON QUÉ FRECUENCIA OCURREN Y QUÉ HACER CON ELLAS		
Síntomas	DETENER la administración del medicamento y habla a tu médico o farmacéutico	PARAR la administración del medicamento y obtén de emergencia atención médica INMEDIATAMENTE
Dolores de cabeza, rigidez en el cuello		✓
Dificultad para respirar, sibilancias, ningún problema la respiración o el pecho opresión		✓
Erupción cutánea, urticaria, hinchazón del cuello, garganta o la lengua o Comezón		✓
Visión borrosa, o cualquier disturbio visual	✓	
Náuseas, vómitos y Diarrea.	✓	
Coloración amarilla de la piel o del blanco de los ojos con o sin picor en la piel.	✓	

UROPHARMA puede causar algunos efectos secundarios, especialmente cuando se usa durante mucho tiempo o en grandes dosis. Cuando estos producen efectos secundarios, puede requerir atención médica.

Reporte todos los síntomas o los efectos secundarios al profesional médico.

UROPHARMA puede convertir su piel o la parte blanca de sus ojos a un tono amarillento. Si usted tiene tal síntoma ponerse en contacto con el médico inmediatamente.

Verificar con el profesional de la salud INMEDIATAMENTE si usted desarrolla frío, fiebre, dolores o molestias musculares u otros síntomas de tipo gripal, hinchazón del cuello, la garganta y la lengua, especialmente si ocurren antes o junto con una erupción en la piel. Estos síntomas pueden ser los primeros signos de una REACCIÓN ALÉRGICA GRAVE a este medicamento.

Esto no es una lista completa de efectos secundarios. Si desarrolla otros síntomas mientras esté tomando UROPHARMA, ver al profesional de la salud. Estos efectos secundarios son raros.

EXCIPIENTES

Almidón Glicolato de Sodio Tipo A, Lactosa Monohidrato, Povidona K-30, Estearato de Magnesio, Agua purificada, Hidroxipropilmetilcelulosa 15-CPS T-2910, Dióxido Titanio C.I. 77891, Talco, Polietilenglicol 6000, Unipure Brown LC 889.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar a temperatura no mayor de 30 °C.

No utilice UROPHARMA después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

MANTENER FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA ELIMINAR EL MEDICAMENTO

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales.

INTIPHARMA S.A.C.

Lima - Perú